

ورقة حقائق لقاح كوفيد-19 للأطفال والشباب

فيما يلي 10 أشياء يجب معرفتها حول لقاح كوفيد-19 للأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عامًا.

الجانبية بشكل عام في غضون يوم إلى ثلاثة أيام. وهي أيضًا علامة إيجابية على أن اللقاح بدأ في العمل.

3. اللقاحات مهمة للأطفال والشباب لأنهم يمكن أن يصابوا بفيروس كوفيد-19 وينقلون العدوى للآخرين، حتى لو لم تظهر عليهم أعراض.

عادةً ما يعاني الأطفال المصابين بفيروس كوفيد-19 من أعراض خفيفة - ومع ذلك، يمكن أن يصاب آخرون بمرض شديد، ويحتاجون إلى دخول المستشفى ويعانون من أعراض أكثر خطورة وطويلة الأمد. في حالات نادرة جدًا، يمكن أن يتسبب الفيروس أيضًا في وفاة أطفال. يمكن أيضًا أن ينقل الأطفال عدوى المرض للآخرين الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.

4. اللقاح آمن جدًا لمعظم الأشخاص وأي شخص لديه حالة طبية.

يجب على الأفراد الذين يتناولون أدوية تُضعف جهاز المناعة لديهم أو الذين يعانون من الحساسية تجاه أي من مكونات اللقاح استشارة مقدم الرعاية الصحية المشرف عليهم. إن لقاحات كوفيد-19 لا تحتوي على البيض أو الجيلاتين (لحم الخنزير) أو الغلوتين أو اللاتكس أو المواد الحافظة أو المضادات الحيوية أو الألومنيوم.

1. تطعيم الأطفال والشباب بعمر 12 سنة فما فوق آمن وفعال.

اللقاحات آمنة وفعالة وأفضل طريقة للحماية من كوفيد-19.

أجازت وزارة الصحة الكندية لقاح فايزر-بيونتك للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عامًا وقررت أنه آمن للشباب دون أي آثار جانبية خطيرة.

تم بالفعل إعطاء ما يقرب من 3 ملايين جرعة من لقاح فايزر-بيونتك لمن تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عامًا في الولايات المتحدة. لم يتم تحديد أي آثار جانبية خطيرة لهذه الفئة العمرية.

في التجارب السريرية، ثبت أن لقاح فايزر-بيونتك فعال للغاية في الحماية من كوفيد-19 للأفراد بعمر 12 عامًا وأكثر. غالبًا ما يكون لدى الشباب استجابة مناعية جيدة جدًا بعد التطعيم، مما يؤدي إلى حماية قوية.

2. قد يعاني الأطفال، كما يعاني البالغين، من آثار جانبية مؤقتة.

تختلف الآثار الجانبية بعد تلقي اللقاح من شخص لآخر، ومعظمها خفيفة ويسهل تحملها. قد يشعر طفلك بإيلام أو ألم في مكان إعطاء اللقاح في أعلى الذراع. وقد يشعر أيضًا بالتعب والصداع وآلام في العضلات أو المفاصل والحمى والقشعريرة. تزول هذه الآثار

نظرًا لأن الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية غالبًا ما يكونون أكثر عرضة للإصابة بالمرض إذا أصيبوا بفيروس كوفيد، فإننا نشجّع بشدة هؤلاء الأفراد على تلقي اللقاح في أسرع وقت ممكن.

وكما هو الحال مع البالغين، فإن ردود الفعل التحسسية لللقاح نادرة. تشمل الأعراض الطفح الجلدي أو تورم الوجه أو اللسان أو الحلق أو صعوبة التنفس.

يُطلب من الأفراد بعد تلقيهم اللقاح مباشرة البقاء في العيادة لمدة 15 إلى 30 دقيقة لمراقبتهم وعلاج رد الفعل التحسسي في حالة حدوثه.

لم تصادق وزارة الصحة الكندية بعد على لقاحات كوفيد-19 للأطفال دون سن 12 عامًا.

5. لا يمكن أن تُصاب بمرض كوفيد-19 من اللقاح.

إن لقاح فايزر-بيونتك المخصص لمرض كوفيد-19 يوجّه جسمك إلى كيفية صنع بروتين غير ضار موجود في فيروس كوفيد-19 والبدء في بناء الأجسام المضادة ضده، حتى يعرف جهازك المناعي كيفية التعرف على الفيروس الحقيقي ومكافحته إذا أصابك الفيروس.

6. إذا كان طفلك مصابًا بالفعل بفيروس كوفيد-19، فلا يزال بإمكانه الحصول على اللقاح.

على الرغم من أن الإصابة السابقة بفيروس كوفيد-19 قد توفر بعض الحماية من الإصابة بالمرض مرة أخرى، إلا أننا لا نعرف إلى متى ستستمر هذه الحماية، وقد لا تحمي من المتغيرات الجديدة. إذا كنت تتعافى من كوفيد-19، فيجب عليك تأخير الحصول على اللقاح حتى تختفي معظم الأعراض ولم تعد في عزلة ذاتية.

7. ليست هناك حاجة لبطاقة صحية.

إذا لم يكن لدى طفلك بطاقة صحية، فقد تحتاج إلى حجز موعدك عبر الهاتف بدلاً من الإنترنت، ويمكنك التحدث إلى مدرستك أو مقدم الرعاية الطبية أو زعيم الطائفة الدينية للحصول على خطاب يوضح اسم طفلك وتاريخ ميلاده وعنوانه.

إذا كان لدى طفلك بطاقة صحية، فيجب عليه إحضارها عند حضور الموعد المحدد.

8. يجب إعطاء لقاح كوفيد-19 بمفرده بمعزل عن اللقاحات الأخرى، إن أمكن.

يجب تحديد مواعيد زمنية للقاحات الأخرى قبل 14 يومًا أو بعد 28 يومًا من لقاح كوفيد-19. إذا تأخرت في الحصول على تطعيمات طفلك، فيُرجى الاتصال بمزود الرعاية الصحية المشرف عليه لوضع خطة للحصول على أحدث اللقاحات الخاصة به.

9. يتم توفير اللقاحات بموافقة مستنيرة.

لا تُعطى لقاحات كوفيد-19 دون الحصول على موافقة مستنيرة من الفرد، بما في ذلك أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عامًا، وطالما أن لديهم القدرة على اتخاذ هذا القرار. هذا يعني فهم العلاج، ولماذا يوصى به، والمخاطر والفوائد في حال قبول الفرد للقاح أو رفضه. إذا كان الفرد غير قادر على الموافقة على تلقي اللقاح، فيجب عليه الحصول على إذن من صانع القرار البديل، مثل الوالد أو الوصي القانوني.

يجب على مقدم الرعاية الصحية والأسرة احترام قرار الشاب فيما يتعلق بالتطعيم. نشجّع الوالدين والأوصياء على مناقشة التطعيم مع أطفالهم قبل الحضور إلى العيادة. التطعيم لفيروس كوفيد-19 طوعي لأي شخص مؤهل في أونتاريو.

10. إن الحصول على لقاح كوفيد-19 سيساعد طفلك على استئناف الأنشطة التي يستمتع بها والتي تدعم صحته العقلية ورفاهيته.

التطعيم أداة مهمة للمساعدة في وقف انتشار مرض كوفيد-19 والسماح للطلاب والعائلات باستئناف الأنشطة العادية بأمان.

عندما يتمتع عدد كافٍ من الأشخاص بالحماية من مرض كوفيد-19، سيبدأ خطر إصابة طفلك بالعدوى في الانخفاض. ستساعد اللقاحات، جنباً إلى جنب مع ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي والاحتياطات الأخرى، في حماية صحة المجتمع على نطاق أوسع. ستكون الأنشطة العادية للأطفال والشباب ممكنة مرة أخرى فقط بعد انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كوفيد-19 في المجتمع على نطاق أوسع.

لمزيد من المعلومات والموارد حول كوفيد-19 واللقاحات:

- [ورقة معلومات لقاح كوفيد-19](#)
- [كوفيد-19 ما يجب أن تعرفه حول موعد الحصول على لقاح كوفيد-19](#)
- احصل على مساعدة ومعلومات بأكثر من 300 لغة. اتصل بالرقم [1-888-999-6488](tel:1-888-999-6488) ([هاتف نصي: 1-866-797-0007](tel:1-866-797-0007)) للحصول على معلومات حول لقاح كوفيد-19. خطوط الهاتف متاحة بين الساعة 8:00 صباحاً و 8:00 مساءً، 7 أيام في الأسبوع. اضغط على الرقم 3 لطلب التحدث بلغتك. قد تضطر إلى الانتظار للتحدث إلى شخص ما إذا كانت أعداد المكالمات كثيرة.